

لقاح كوفيد-19

أسئلة مكررة وإجاباتها

IMMUNITY
FAMILY
FRIENDS
SAFETY
PROTECTION
COMMUNITY
DEFENSE
SAFE &
EFFECTIVE

New Haven Health Department

Prevent. Promote. Protect.

TOGETHER

NEW HAVEN



المحتويات

أسئلة عامة

- 1 هل لقاح كوفيد-19 إلزامي؟
- 2 أين أذهب للحصول على التطعيم؟
- 3 هل هناك فرق بين لقاحات كوفيد-19 المختلفة؟
- 4 هل يمكنني اختيار اللقاح الذي أحصل عليه؟
- 5 كيف أعرف متى أحدد موعد التطعيم الثاني؟
- 6 ماذا لو فاتتني الجرعة الثانية \ نسيت الذهاب للموعد الثاني؟
- 7 هل لا زلت معرضاً للإصابة بكوفيد-19 بعد تلقيحي؟
- 8 قريبي في دار لرعاية المسنين أو في المستشفى ، هل يمكنني زيارتهم بعد التطعيم؟
- 9 هل سيطلب مني حمل ملفات تدل على تلقيحي بعد الحصول على التطعيم؟
- 10 بمجرد تلقي التطعيم، هل يمكنني التوقف عن ارتداء القناع وممارسة التباعد الاجتماعي؟

أسئلة متعلقة بالأمان

- 11 بما أن اللقاح جديد جداً ، كيف تعرف أنه لن تكون هناك آثار صحية
- 12 هل التطعيم آمن إذا كنت أعاني من حالة صحية كامنة؟
- 13 لقد أصبت بردود فعل تحسسية تجاه الطلقات الأخرى ، هل يمكنني الحصول على لقاح كوفيد-19؟
- 14 هل تطعيم كوفيد-19 آمن للأطفال؟
- 15 هل هذا اللقاح يسبب العقم؟
- 16 أعاني من حساسية تجاه الطعام ، هل يمكنني الحصول على اللقاح؟
- 17 أعاني من حساسية موسمية ، هل يمكنني الحصول على اللقاح؟

أسئلة عامة

- 1 هل لقاح كوفيد-19 إلزامي؟
لا ، يمكنك اختيار عدم الحصول على لقاح كوفيد-19.
- 2 أين أذهب للحصول على التطعيم؟
ستتمكن من الحصول على لقاح كوفيد-19 في العديد من المواقع. قد تتمكن من زيارة مقدم الرعاية الطبية الخاص بك أو عيادة مجتمعية. نظراً لإتاحة اللقاح للجمهور ، سيتم مشاركة المزيد من المعلومات حول المواقع.
- 3 هل هناك فرق بين لقاحات كوفيد-19 المختلفة؟
كلاهما Moderna و Pfizer هناك اختلافات طفيفة بين لقاحي و Pfizer أثبتت فعاليته أثناء التجارب السريرية. لقاحات مخصصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً Moderna فما فوق. كلا اللقاحين يتطلب جرعتين. يجب إعطاء جرعتين من بفاصل 21 يوماً. يجب إعطاء جرعتين من لقاح Pfizer بفاصل 28 يوماً Moderna.
- 4 هل يمكنني اختيار اللقاح الذي أحصل عليه؟
بشكل عام ، قد يتوفر لقاح واحد فقط من خلال مزودك. للأسئلة أو المخاوف بشأن تلقي لقاح معين ، نقترح عليك التحدث مع مقدم رعاية طبية.
- 5 كيف أعرف متى أحدد موعد التطعيم الثاني؟
عندما تحصل على جرعتك الأولى من اللقاح ، سيتم إخبارك بموعد العودة. يجب أن تحصل على بطاقة تذكير وقد تتلقى رسالة تذكير نصية أو بريدًا إلكترونيًا أو مكالمة هاتفية حول جرعتك الثانية.
- 6 ماذا لو فاتتني الجرعة الثانية \ نسيت الذهاب للموعد الثاني؟
نقترح عليك الاتصال بمزودك الطبي حول الخطوات التالية إذا فاتتك الجرعة الثانية.
- 7 هل لا زلت معرضاً للإصابة بكوفيد-19 بعد تلقيحي؟
نعم، لا يضمن اللقاح حماية بنسبة 100٪ من كوفيد-19. سيستغرق الأمر من 10 إلى 14 يوماً بعد اللقطة الثانية للحصول على أكبر قدر من الحماية. يمكنك نشر كوفيد-19 بعد أن يتم تطعيمك بالكامل. لا يزال بإمكانك أيضاً الحصول على كوفيد-19 بعد تلقي اللقاح ، ولكن ستكون الأعراض أقل حدة ولن تمرض لفترة طويلة.
- 8 قريبي في دار لرعاية المسنين أو في المستشفى ، هل يمكنني زيارتهم بعد التطعيم؟
يجب عليك الاستمرار في اتباع الإرشادات الصادرة عن إدارة الصحة العامة.
- 9 هل سيطلب مني حمل ملفات تدل على تلقيحي بعد الحصول على التطعيم؟
بمجرد تلقي التطعيم، هل يمكنني التوقف عن ارتداء القناع وممارسة التباعد الاجتماعي؟
لا ، ولكن مزودك سيتأكد من أن سجلاتهم تبين أنك تلقيت اللقاح.
- 10 بمجرد تلقي التطعيم، هل يمكنني التوقف عن ارتداء القناع وممارسة التباعد الاجتماعي؟
لا ، سنظل بحاجة إلى ارتداء قناع وممارسة التباعد الاجتماعي.

أسئلة متعلقة بالأمان

- 11 بما أن اللقاح جديد جداً ، كيف تعرف أنه لن تكون هناك آثار صحية طويلة المدى من الحصول عليه؟
من بين ملايين الجرعات التي تم تناولها حتى الآن ، لا توجد آثار ضارة طويلة الأجل تم الإبلاغ عنها. سنستمر في تتبع البيانات والتعلم كي نكون قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدامها وأي آثار جانبية.
- 12 هل التطعيم آمن إذا كنت أعاني من حالة صحية كامنة؟
نعم. الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من كوفيد-19. لذلك ، من المهم أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية مثل أمراض القلب وأمراض الرئة والسكري والسمنة. من المرجح أن يمرض الأشخاص المصابون بهذه الحالات بشدة من كوفيد-19. يوصى بتطعيم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات. يجب على الأفراد الذين عانوا من ردود فعل تحسسية سابقة للأدوية القابلة للحقن التحدث مع مقدمي الخدمات الطبية قبل تلقي لقاح كوفيد-19.
- 13 لقد أصبت بردود فعل تحسسية تجاه الطلقات الأخرى ، هل يمكنني الحصول على لقاح كوفيد-19؟
يجب أن تتحدث مع مقدم الرعاية الطبية حول الحساسية التي قد تجعلها محفوفة بالمخاطر بالنسبة لك للحصول على لقاح كوفيد-19. سيساعدك طبيبك على تحديد ما إذا كان من الآمن لك التطعيم.
- 14 هل تطعيم كوفيد-19 آمن للأطفال؟
في هذا الوقت ، لقاحات كوفيد-19 مخصصة فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق. يجب تكرار البحث الذي تم إجراؤه على لقاح كوفيد-19 للأعمار من 16 عاماً فما فوق في الأطفال دون سن 16 عاماً.
- 15 هل هذا اللقاح يسبب العقم؟
لا هذا غير صحيح. اللقاح مدعوم من الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد.
- 16 أعاني من حساسية تجاه الطعام ، هل يمكنني الحصول على اللقاح؟
نعم. يمكن العثور على معلومات حول التطعيم والحساسية لـ كوفيد-19 على موقع CDC.
- 17 أعاني من حساسية موسمية ، هل يمكنني الحصول على اللقاح؟
نعم. يمكن العثور على معلومات حول التطعيم والحساسية لـ كوفيد-19 على موقع CDC.